



السياسة - الحساسية المفرطة في المدرسة الابتدائية

الغرض

لشرح مدرسة إيبينج الابتدائية لأولياء الأمور فيومقدمي الرعاية والموظفين والطلاب العمليات والإجراءات المعمول بها لدعم الطلاب الذين تم الابتدائية متوافقة مع الأمر Epping تشخيصهم على أنهم معرضون لخطر الإصابة بالحساسية المفرطة. تضمن هذه السياسة أيضًا أن مدرسة الوزاري 706 وإرشادات القسم لإدارة الحساسية المفرطة.

النطاق

تنطبق هذه السياسة على:

- جميع الموظفين ، بما في ذلك موظفو الإغاثة العرضيون والمتطوعون
- جميع الطلاب الذين تم تشخيص إصابتهم بالحساسية المفرطة ، أو الذين قد يحتاجون إلى علاج طارئ لرد فعل تحسسي ، وآبائهم ومقدمي الرعاية لهم.

سياسة

بيانالمدرسة

الابتدائية ستلتزم تمامًا بالقرار الوزاري 706 والإرشادات المرتبطة به التي نشرتها وزارة التعليم والتدريب Epping مدرسة

الحساسية الحساسية

المفرطة المفرطة هي رد فعل تحسسي شديد يحدث بعد التعرض لمسببات الحساسية. أكثر مسببات الحساسية شيوعًا للأطفال في سن المدرسة هي المكسرات والبيض وحليب البقر والأسماك والمحار والقمح وفول الصويا والسّمسم واللاتكس وبعض لسعات الحشرات والأدوية

الأعراض

يمكن أن تشمل علامات وأعراض رد الفعل التحسسي الخفيف إلى المتوسط ما يلي:

- انتفاخ الشفتين والوجه والعينين
- خلايا أو كدمات
- وخز في الفم.

يمكن أن تشمل علامات وأعراض التآق ، وهو رد فعل تحسسي شديد ، ما يلي:

تنفس صعب / صاخب

- تورم اللسان
- صعوبة في الكلام و / أو صوت أجش
- أزيز أو سعال مستمر
- الدوخة المستمرة أو الانهيار
- يبود الطالب شاحبًا أو مرئًا
- ألم البطن و / أو القيء

عادة ما تظهر الأعراض في غضون عشر دقائق وحتى ساعتين بعد التعرض لمسببات الحساسية ، ولكن يمكن أن تظهر في غضون بضعة دقائق.

العلاج:

إعطاء الأدرينالين كحقن في عضلات الفخذ الأوسط الخارجي هو العلاج الإسعافي الأولي للحساسية المفرطة.

يتم وصف حاقن الأدرينالين الذاتي للأفراد الذين تم تشخيصهم على أنهم معرضون لخطر الحساسية المفرطة لاستخدامها في حالات الطوارئ. تم تصميم حاقنات الأدرينالين الذاتية هذه بحيث يمكن لأي شخص استخدامها في حالات الطوارئ.

خطط إدارة

الذين تم تشخيصهم من قبل ممارس طبي على الحساسية المفرطة الفردية يجب أن يكون لدى Epping Primary School جميع الطلاب في أنهم معرضون لخطر المعاناة من رد فعل تحسسي خطة فردية لإدارة الحساسية المفرطة. عند الإخطار بتشخيص الحساسية المفرطة ، يكون الابتدائية مسؤولاً عن وضع خطة بالتشاور مع أولياء أمور الطالب / مقدمي الرعاية Epping مدير مدرسة.

الابتدائية وحيثما أمكن Epping سيتم وضع خطة إدارة الحساسية المفرطة الفردية في أقرب وقت ممكن عملياً بعد تسجيل الطالب في مدرسة. ذلك ، قبل اليوم الأول للطلاب

:يجب الأباء ومقدمي الرعاية

- للحساسية المفرطة من الطبيب الممارس للطلاب وتقديم نسخة إلى المدرسة في أقرب وقت ASCIA علنا الحصول على خطة عمل ممكن عملياً
- قم بإبلاغ المدرسة كتابياً على الفور إذا كان هناك تغيير ذي صلة في الحالة الطبية للطلاب واحصل على خطة عمل محدثة من للتأق ASCIA
- المشاركة في المراجعات السنوية لخطة الطالب .

يجب أن تتضمن خطة إدارة الحساسية المفرطة الفردية الخاصة بكل طالب ما يلي:

- معلومات حول الحالة الطبية للطلاب المتعلقة بالحساسية وإمكانية حدوث تفاعل تأقي ، بما في ذلك نوع الحساسية التي يمتلك الطالب
- معلومات حول العلامات أو الأعراض التي قد تظهر على الطالب في حالة حدوث رد فعل تحسسي بناءً على تشخيص مكتوب من طبيب طبيالممارس
- استراتيجيات لتقليل مخاطر التعرض لمسببات الحساسية المعروفة أثناء وجود الطالب تحت رعاية أو إشراف موظفي المدرسة ، بما في ذلك في ساحة المدرسة ، في المخيمات والرحلات ، أو في المناسبات الخاصة التي تنظمها المدرسة أو تنظمها أو تحضرها
- اسم الشخص (الأشخاص) المسؤول عن تنفيذ استراتيجيات تقليل المخاطر التي تم تحديدها في الخطة
- معلومات حول مكان تخزين الأدوية الخاصة بالطلاب
- تفاصيل الاتصال في حالات الطوارئ
- محدثة للحساسية المفرطة التي أكملها الطبيب الممارس للطلاب ASCIA الخاصة بالطلاب خطة عمل

مراجعة وتحديث خطط إدارة الحساسية المفرطة

الفردية ستتم مراجعة خطة إدارة الحساسية المفرطة الفردية للطلاب وتحديثها على أساس سنوي بالتشاور مع أولياء الأمور / مقدمي الرعاية للطلاب. ستتم مراجعة الخطة أيضاً ، وعند الضرورة ، يتم تحديثها في الظروف التالية:

- في أقرب وقت ممكن عملياً بعد أن يعاني الطالب من رد فعل تحسسي في المدرسة
- إذا كانت الحالة الطبية للطلاب ، من حيث صلتها بالحساسية وإمكانية حدوث تفاعل تأقي ، تتغير
- عندما يشارك الطالب في نشاط خارج الموقع ، بما في ذلك المعسكرات والرحلات ، أو في المناسبات الخاصة بما في ذلك الاحتفالات والحفلات الموسيقية.

الادريينالين autoinjectors موقع الخطط و

:الأدرينالين على أشخاصهم autoinjectors لن يبقى Students

سيتم تخزين مع عصابة حلزونية على خطة العمل لالعوار في المكتب في مخزن على مجلس الوزراء نسخ من خطة إدارة الفردية A الحساسية المفرطة لكل طالب، جنبا إلى جنب مع حاقن الأدرينالين التلقائي للطالب. يجب تسمية محاقن الأدرينالين الذاتية باسم الطالب.

استراتيجيات تقليل المخاطر

يجب أن يوضح هذا القسم استراتيجيات تقليل المخاطر التي ستضعها مدرستك لتقليل احتمالية إصابة الطالب برد فعل تحسسي في المدرسة. يرجى النظر في استراتيجيات جميع الأنشطة المدرسية ، بما في ذلك:

(خلال أنشطة الفصل الدراسي (بما في ذلك التدوير في الفصل ، والصفوف المتخصصة والاختيارية

- بين الفصول وفترات الراحة الأخرى
- في المقاصف
- خلال أوقات الاستراحة والغداء
- قبل وبعد المدرسة
- المعسكرات والرحلات ، أو في المناسبات الخاصة التي تنظمها المدرسة أو تنظمها أو تحضرها (على سبيل المثال ، الحفلات الصفية ، والموضوعات الاختيارية وخبرة العمل ، والأيام الثقافية ، والفعاليات ، والحفلات الموسيقية ، والأحداث في المدارس الأخرى (، والمسابقات أو التوغلات

epipen. سيتم استدعاء موظفي المكتب على الفور إذا كان لدى الطفل رد فعل تحسسي للحصول على الطلاب

:لتقليل خطر إصابة الطالب برد فعل تحسسي في مدرسة المثال ، وضعنا الاستراتيجيات التالية:

- يتم تذكير الموظفين والطلاب بانتظام بغسل أيديهم بعد تناول الطعام ؛
- لا يُشجع الطلاب على مشاركة الطعام
- ، صناديق قمامة في المدرسة يظلوا مغطاة بأغطية لتقليل مخاطر جذب الحشرات
- ويجب أن يجب ارتداء القفازات عند التقاط الأوراق أو القمامة في الملعب ؛
- ، يتم تدريب موظفي مقصف المدرسة على التعامل مع الطعام المناسب لتقليل مخاطر التلوث المتبادل
- وسيتم إبلاغ مجموعات السنة الحساسية التي يجب تجنبها قبل حفلات الفصل أو الأحداث أو أعياد الميلاد
- للاستخدام العام في مقصف المدرسة أو المكتب وفي حقيبة العمل في الفناء EpiPen بمسببات، وسيتم تخزين لسهولة الوصول إليها
- سيتضمن التخطيط للأنشطة خارج الموقع استراتيجيات تقليل المخاطر للطلاب المعرضين لخطر الحساسية المفرطة بما في ذلك متطلبات الإشراف والعدد المناسب للموظفين المدربين وإجراءات الاستجابة للطوارئ وضوابط المخاطر الأخرى المناسبة للنشاط والطلاب الحاضرين

حاقنات الأدرينالين التلقائية للاستخدام العام ستحتفظ

للاستخدام العام، لتلك التي يقدمها الآباء ومقدمو الرعاية لطلاب rs كدعم autoinjector الابتدائية بمخزون من الأدرينالين Epping مدرسة معينين ، وكذلك للطلاب الذين قد يعانون من رد فعل لأول مرة في المدرسة .

"سيتم تخزين حاقنات الأدرينالين التلقائية للاستخدام العام في المكتب ، في غرفة التخزين أعلى الخزانة السوداء وتسمى "الاستخدام العام

:موظفو المكتب مسؤولون عن ترتيب شراء حاقنات الأدرينالين الذاتية للاستخدام العام ، وسوف يأخذون في الاعتبار

- عدد الطلاب المسجلين في مدرسة المثال المعرضين لخطر الحساسية المفرطة
- إمكانية الوصول إلى محاقن الأدرينالين الذاتية التي يوفرها الآباء
- توافر إمدادات كافية من الحاقنات الذاتية للاستخدام العام في مواقع مختلفة في المدرسة ، وكذلك في المعسكرات والرحلات والأحداث
- والعمر المحدود لحاقن الأدرينالين التلقائي ، والحاجة إلى استبدال حاقنات الأدرينالين الذاتية عند استخدامها أو قبلها لتنتهي ،

الاستجابة للطوارئ

في حالة حدوث رد فعل تحسسي ، يجب اتباع إجراءات الاستجابة للطوارئ في هذه السياسة ، جنبًا إلى جنب مع إجراءات الإسعافات الأولية العامة للمدرسة ، وإجراءات الاستجابة للطوارئ وخطة إدارة الحساسية المفردة الفردية للطلاب.

يحتفظ أحد أعضاء بقائمة كاملة وحديثة بالطلاب الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر الحساسية المفردة ويتم طاقم المكتب تخزينها في المكتب ، في مجلد أزرق بعنوان "الطلاب الذين يعانون من حالة طبية" ، على رف الكتب من أجل المعسكرات والرحلات والمناسبات الخاصة ، سيكون الموظف المعين مسؤولاً عن الاحتفاظ بقائمة من الطلاب المعرضين لخطر الحساسية المفردة الذين يحضرون الحدث الخاص ، جنبًا إلى جنب مع خطط إدارة الحساسية المفردة الفردية وحقن الأدرينالين الذاتي ، عند الاقتضاء.

إذا تعرض أحد الطلاب لرد فعل تحسسي في المدرسة أو أثناء نشاط مدرسي ، فيجب على طاقم المدرسة

الخطوة	إجراء
1	<ul style="list-style-type: none"> • ضع الشخص مسطحًا • لا تسمح لهم بالوقوف أو المشي • إذا كان التنفس صعبًا ، اسمح لهم بالجلوس <ul style="list-style-type: none"> • كن هادئًا ومطمئنًا • لا تتركهم بمفردهم • اطلب المساعدة من موظف آخر أو طالب موثوق به لتحديد موقع حاقن الأدرينالين التلقائي للطلاب أو المحقنة التلقائية للاستخدام العام للمدرسة ، وخطة إدارة الحساسية المفردة للطلاب ، المخزنة في المكتب ، في غرفة التخزين على الخزنة السوداء • إذا لم تكن خطة الطالب متاحة على الفور ، أو يبدو أنهم يواجهون رد فعل لأول مرة ، فاتبع الخطوات من 2 إلى 5
2	<p>قم 2 (إذا كان الطالب أقل من 20 كجم) EpiPen Jr أو EpiPen بإدارة</p> <ul style="list-style-type: none"> • إزالة من وعاء بلاستيكي • (شكل قبضة حول قلم حقن الأدرينالين واسحب غطاء الأمان الأزرق (غطاء • (ضع نهاية برتقالية على منتصف الفخذ الخارجي للطلاب (مع أو بدون ملابس • ادفع لأسفل بقوة حتى تسمع نقرة أو تشعر بها واستمر في مكانها لمدة 3 ثوانٍ • إزالة EpiPen • EpiPen ملاحظة الوقت الذي تدار • إلى أن تسلم إلى عناصر الإسعاف الطبي جنبًا إلى جنب مع الوقت الإدارة EpiPen الإبقاء على استخدام
3	(استدعاء سيارة إسعاف (000)
4	إذا كان هناك أي تحسن أو أعراض حادة التقدم (كما هو موضح في عصابة حلزونية خطة العمل للعوار)، قد يكون المزيد من جرعات الأدرينالين تدار كل خمس دقائق ، إذا كانت حاقنات الأدرينالين الذاتية الأخرى متوفرة.

إذا بدا أن الطالب يعاني من رد فعل تحسسي شديد ، ولكن لم يتم تشخيصه مسبقاً بحساسية أو معرض لخطر الحساسية المفرطة ، يجب على طاقم المدرسة اتباع الخطوات من 2 إلى 5 على النحو الوارد أعلاه.

ملاحظة: إذا كنت في شك ، فمن الأفضل استخدام حاقن الأدرينالين التلقائي بدلاً من عدم استخدامه ، حتى لو كان رد الفعل في الإدراك المتأخر [ليس الحساسية المفرطة. يعتبر نقص العلاج من الحساسية المفرطة أكثر ضرراً وقد يهدد الحياة من الإفراط في علاج رد فعل تحسسي خفيف [إرشادات الحساسية المفرطة](#)]. إلى متوسط. الرجوع إلى الصفحة 41 من [إرشادات الحساسية المفرطة](#).

خطة الاتصال

الابتدائية على الويب بحيث يمكن للوالدين والأعضاء الآخرين في المجتمع المدرسي Epping ستكون هذه السياسة متاحة على موقع مدرسة الابتدائية إجراءات إدارة الحساسية المفرطة. أولياء الأمور ومقدمي الرعاية للطلاب Epping الوصول بسهولة إلى المعلومات حول في مدرسة الابتدائية سيتم أيضاً تزويدالذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر الحساسية المفرطة بنسخة من هذه Epping المسجلين في مدرسة السياسة.

وما إلى ذلك ، CRT / سيتم تضمين هذه السياسة في حزم تعريف المتطوعين.

المدير مسؤول عن ضمان أن جميع الموظفين المعنيين ، بما في ذلك موظفي الإغاثة العرضيين وموظفي الكانتين والمتطوعين على دراية بهذه الابتدائية لإدارة الحساسية المفرطة. سيتلقى موظفو الإغاثة العرضيون والمتطوعون المسؤولون عن Epping السياسة وإجراءات مدرسة رعاية و / أو الإشراف على الطلاب الذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر الحساسية المفرطة أيضاً موجزاً شفهيًا حول هذه السياسة ودورهم في الاستجابة لرد فعل الحساسية وعند الاقتضاء ، الهوية من الطلاب المعرضين للخطر.

المدير مسؤول أيضاً عن ضمان تدريب الموظفين المعنيين وإطلاعهم على إدارة الحساسية المفرطة ، بما يتفق معالإدارة الخاصة بالحساسية المفرطة إرشادات.

تدريب الموظفين

:سيضمن المدير أن طاقم المدرسة التاليين مدربين تدريباً مناسباً على إدارة الحساسية المفرطة

جميع موظفي المدرسة الذين ينظمون فصولاً يحضرها الطلاب المعرضون لخطر الحساسية المفرطة يجب أن يكون .

قد أكملوا:

- دورة تدريبية معتمدة وجهاً لوجه لإدارة الحساسية المفرطة في السنوات الثلاث الماضية ، أو
- دورة تدريبية معتمدة عبر الإنترنت لإدارة الحساسية المفرطة في العامين الماضيين.

أو ، VIC مع 22303 ASCIA eTraining تستخدم مدرسة المثال الدورة التدريبية التالية [أدخل التفاصيل ، على سبيل المثال ، دورة 22300VIC 10313 أو NAT].

[ملاحظة ، للحصول على تفاصيل حول وحدات تدريب الموظفين المعتمدة ، انظر الصفحة 13 من [إرشادات الحساسية المفرطة](#)

يُطلب من الموظفين أيضاً حضور جلسة إيجاز عن إدارة الحساسية المفرطة وهذه السياسة مرتين على الأقل في السنة (مع أول إحاطة تُعقد في بداية العام الدراسي) ، يتم تيسيرها من قبل الموظف / الموظفين الذين أكملوا بنجاح دورة إدارة الحساسية المفرطة خلال العامين الماضيين بما في ذلك الدور الإضافي ، أي مدير المدرسة أو مشرف الحساسية المفرطة في المدرسة. سنتناول كل إحاطة

- هذه السياسة
- أسباب وأعراض وعلاج الحساسية المفرطة

- هويات الطلاب مع حالة طبية التي تتعلق الحساسية واحتمال رد فعل تحسسي، وحيث يقع أديتهم
- مدرب الأدرينالين autoinjector الأدرينالين، بما في ذلك على أيدي الممارسة مع autoinjector كيفية استخدام
- العامة الإسعافات الأولية والطوارئ إجراءات الاستجابة للمدرسة
- موقع ، والوصول إلى ، حاقتات الأدرينالين الذاتية التي تم توفيرها من قبل الآباء أو التي تم شراؤها من قبل المدرسة للاستخدام العام

عندما يلتحق طالب جديد بمدرسة إيبينج الابتدائية المعرضة لخطر الإصابة بالحساسية المفرطة ، يقوم المدير أو المندوب بوضع خطة مؤقتة بالتشاور مع والدي الطالب والتأكد من تدريب الموظفين المناسبين وإطلاعهم في أقرب وقت ممكن

سيضمن المدير أنه بينما يكون الطلاب المعرضون لخطر الحساسية المفرطة تحت رعاية المدرسة أو إشرافها خارج الأنشطة الصفية العادية ، بما في ذلك في ساحة المدرسة ، أو في المخيمات والرحلات ، أو في أيام المناسبات الخاصة ، هناك عدد كافٍ من المدارس الموظفين الحاليين الذين تم تدريبهم على إدارة الحساسية المفرطة

مزيد من المعلومات والموارد

- دليل السياسة والاستشارات المدرسية
 - [الحساسية المفرطة](#)
 - [إدارة الحساسية المفرطة في المدارس](#)
- [الحساسية والتأق أستراليا: استراتيجيات تقليل المخاطر](#)
- [التعليم ورعاية الأطفال: ASCIA: إرشادات](#)
- [مستشفى الأطفال الملكي: الحساسية والمناعة](#)
- [احتياجات الرعاية الصحية](#)
- [إرشادات الحساسية المفرطة](#)

دورة مراجعة

تم تحديث هذه السياسة آخر مرة في يوليو 2020 ومن المقرر مراجعتها في عام 2021

سيكمل مدير المدرسة قائمة المراجعة السنوية لإدارة المخاطر لإدارة الحساسية المفرطة للمساعدة في تقييم ومراجعة هذه السياسة والدعم المقدم للطلاب المعرضين لخطر الحساسية المفرطة